

TEATsealer

The natural way to dry off cows



TEATsealer

TEATsealer

La période sèche est une période à risque pour une vache laitière.

Du fait que pendant les premières semaines du tarissement le canal du trayon peut être encore ouvert, diverses bactéries peuvent pénétrer et remonter le canal du trayon. Cela peut provoquer une infection immédiate, mais cela peut également se manifester seulement au cours de la lactation suivante. TEATsealer obture le trayon pendant les premières semaines du tarissement.

Conseils d'utilisation du TEATsealer

TEATsealer est une solution pour utilisation dans le canal du trayon, sans antibiotiques et qui est administrée au moment du tarissement. Elle soigne la peau et assure une obturation totale du trayon pendant 2 semaines. Du fait qu'elle soit composée de substances organiques, elle se résorbera ensuite complètement de façon naturelle. Portez des gants propres pendant l'utilisation et veillez à ce que les trayons soient bien désinfectés.

Ingrédients

TEATsealer est un produit naturel à base d'huile minérale et de composants soignants.

Atouts :


- Obturation du canal du trayon pendant 2 semaines après le tarissement.
- Pas de résidus dans le colostrum
- Produit naturel, se résorbe complètement dans le pis
- Réduit l'écoulement du lait après le tarissement
- Effet soignant pour le canal du trayon interne
- Facile à administrer. ►



Bien que ce texte ait été rédigé et mis en page avec le plus grand soin, aucun droit ne pourra être tiré de son contenu. Heemskerk International B.V. et les entreprises liées ne pourront en aucun cas être tenues responsables de toute information erronée de quelque nature qu'elle soit. En raison du développement continu de nos produits, il se peut que les visuels présentés ne correspondent pas à la réalité. Copyright Heemskerk International B.V.

Heemskerk België B.V.
T: 014 - 479 544

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com




► Méthode recommandée lors du tarissement

Le tarissement des vaches prend du temps et exige de l'attention. Pour tarir les vaches prenez donc un jour fixe toutes les (2) semaines. Essayez de tarir les animaux avec une production journalière aussi faible que possible.



Etape 1

- Consultez les données historiques concernant le taux cellulaire et les mammites et/ou contrôlez le lait avec un CellCheck pour déterminer s'il est nécessaire d'administrer un antibiotique pendant la période sèche. Consultez éventuellement votre vétérinaire.



Etape 2

- Trayez la vache comme d'habitude, assurez-vous que le pis soit bien vide.
- Portez toujours des gants propres ou une nouvelle paire de gants.



Etape 3

- Désinfectez le trayon qui est le plus éloigné en utilisant des lingettes désinfectantes TEATER CLEAN®. Pour cela vous pouvez également tremper le trayon dans une solution de trempage approuvée et ensuite l'essuyer avec un chiffon/papier propre.
- Si nécessaire injectez l'antibiotique de tarissement dans le trayon.
- Désinfectez à nouveau le trayon.



Etape 4

- Retirez le bouchon du TEATsealer avec le pouce et l'index. Evitez tout contact avec l'extrémité de la canule.



Etape 5

- Introduisez l'injecteur TEATsealer dans le trayon, en obturant la base du trayon.
- Répétez les étapes 3,4 et 5 pour les 3 autres trayons. Traitez chaque trayon séparément selon un ordre déterminé. Prenez pour chaque trayon une nouvelle lingette désinfectante.



Etape 6

- Trempez ensuite le trayon dans une solution de trempage approuvée.



Etape 7

- Marquez la vache de sorte qu'elle soit séparée des vaches en lactation.



Etape 8

- Après l'administration la vache doit rester debout pendant au moins 30 minutes.

**HEEMSKERK**