

TEATsealer

The natural way to dry off cows



TEATsealer



TEATsealer

Die Trockenstehzeit ist eine riskante Periode für Milchkühe. Da der Zitzenkanal in den ersten Wochen der Trockenstehzeit noch offen sein kann, können Bakterien eindringen. Dies kann sofort Probleme verursachen oder sich erst im Laufe der nächsten Laktation zeigen. TEATsealer versiegelt die Zitze in den ersten Wochen der Trockenstehzeit.

Gebrauchsanweisung TEATsealer:

TEATsealer ist eine antibiotikafreie Suspension und wird während des Trockenstellens verabreicht. Die Zitze wird 2 Wochen lang vollständig und hautpflegend versiegelt. Da es aus organischen Bestandteilen besteht, wird es anschließend auf natürliche Weise vollständig resorbiert. Tragen Sie bei der Anwendung saubere Handschuhe und stellen Sie sicher, dass die Zitzen gut desinfiziert sind.

Inhaltsstoffe

TEATsealer ist ein natürliches Produkt auf Basis verschiedener Öle und pflegenden Bestandteilen.

Stärken


- Versiegelt die Zitzen für 2 Wochen nach dem Trockenstellen
- Keine Rückstände in der Biestmilch
- Natürliches Produkt, wird vollständig im Euter resorbiert
- Vermeidet Milchfluss nach dem Trockenstellen
- Einfache Verabreichung ►



Die Texte und das Layout wurden mit der größten Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Heemskerk International B.V. und verbundene Unternehmen können nicht für eventuell falsche Informationen jeglicher Art haftbar gemacht werden. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte ist es möglich, dass Abbildungen optisch nicht mit der Realität übereinstimmen. Copyright Heemskerk International B.V.

Heemskerk GmbH
T: +49 (0)800 - 1808990
(kostenlos)

info@heemskerk-dairy.com
www.heemskerk-dairy.com




► Empfohlene Arbeitsweise rund um das Trockenstellen

Das Trockenstellen von Kühen erfordert Zeit und Aufmerksamkeit. Legen Sie darum einen fixen Tag in der Woche oder alle 2 Wochen fest, an denen die Kühe trockengestellt werden. Versuchen Sie, die Tiere mit einer möglichst niedrigen Tagesproduktion trockenzustellen.



Schritt 1

- Konsultieren Sie historische Daten in Bezug auf Zellzahl und Mastitis und/oder überprüfen Sie die Milch mit unserem CellCheck, um zu entscheiden, ob während der Trockenstehzeit ein Antibiotikum zu verabreichen ist. Konsultieren Sie eventuell Ihren Tierarzt.



Schritt 2:

- Melken Sie die Kuh anschließend routinemäßig und sorgen Sie dafür, dass das Euter gut leer gemolken wird.
- Tragen Sie immer saubere oder neue Handschuhe.



Schritt 3:

- Desinfizieren Sie die Zitze, die am weitesten von Ihnen entfernt ist, mithilfe unserer TEATER CLEAN® Einweg-Tücher. Sie können die Zitze auch mit einem zugelassenen Dippmittel behandeln und dann mit einem sauberen und trockenen Tuch/Papier trocken wischen.
- Falls erforderlich, führen Sie den antibiotischen Trockensteller in die Zitze ein.
- Desinfizieren Sie die Zitze erneut.



Schritt 4:

- Entfernen Sie die Kappe von TEATsealer mit Daumen und Zeigefinger. Vermeiden Sie dabei immer den Kontakt mit der Kanülenspitze.



Schritt 5:

- Entleeren Sie den TEATsealer-Tube, während Sie die Zitzenbasis zudrücken.
- Wiederholen Sie Schritt 3, 4 und 5 für die übrigen Zitzen. Behandeln Sie jede Zitze separat gemäß einer feststehenden Reihenfolge. Nehmen Sie für jede Zitze ein neues Desinfektionstuch.



Schritt 6:

- Dippen Sie anschließend die Zitze mit einem zugelassenen, registrierten Zitzendippmittel.



Schritt 7:

- Markieren Sie die Kuh, damit diese von den laktierenden Kühen separiert werden kann.



Schritt 8:

- Sorgen Sie dafür, dass die Kuh nach der Verabreichung mindestens 30 Minuten lang steht.

**HEEMSKERK**